


CytoSorb-Therapie – Indikationsstellung

Patientenzustand



⚡ Diagnose ≤ 6h

CytoSorb Einsatz Innerhalb von 24h für beste Ergebnisse

≤ 24h

Risiko: MODS / Mortalität

Therapeutisches Ziel: Schockumkehr

Mögliche Indikationen für die CytoSorb-Therapie

auf der Intensivstation:

- Refraktärer septischer Schock
- Vasoplegischer Schock z.B. postoperativ oder bei ECMO-Therapie
- Toxic-Shock-Syndrom
- Nekrotisierende Fasziiitis
- Meningokokken-Sepsis
- Hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH)
- Pankreatitis
- Verbrennung
- Trauma
- Leberversagen
- Rhabdomyolyse

Besuchen Sie <http://literatur.cytosorb.de>
für den kompletten Überblick über alle Referenzen

CytoSorbents Europe GmbH


Müggelseedamm 131
12587 Berlin | Deutschland

T +49 30 654 99 145
F +49 30 654 99 146
support@cytosorbents.com

CytoSorbents Switzerland GmbH

c/o MGM GmbH
Wielandstrasse 5 | 4153 Reinach BL | Schweiz

T +41 61 713 73 78
F +41 61 713 73 79
support@cytosorbents.com



Diese Therapieform hat einen unveränderlichen Charakter und kann die individuelle Therapieentscheidung des behandelnden Arztes nicht ersetzen. Der behandelnde Arzt ist in jedem Fall für die Festlegung und Durchführung geeigneter diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen für jeden individuellen Patienten verantwortlich.

CytoSorb und CytoSorbents sind Marken der CytoSorbents Corporation, USA.
B1053801DE2018 © Copyright 2018, CytoSorbents Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.